

DIMEXANOL™

voor kinderen

Morilyte™



Lees de volledige gebruiksaanwijzing voordat u Dimexanol™ voor kinderen gebruikt en bewaar deze zorgvuldig, het bevat belangrijke informatie. Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer informatie of advies wilt of wanneer u na inname van Dimexanol™ voor kinderen ongewone bijwerkingen ervaart.

1. Waarvoor wordt Dimexanol™ voor kinderen gebruikt

Dankzij zijn unieke 2-in-1-formule behandelt Dimexanol™ voor kinderen doeltreffend acute diarree en bevordert het tevens de rehydratie (vocht-aanvulling):

- Het isoleert de stoffen die diarree veroorzaken en voert deze via de ontlasting af. Bovendien beschermt het de darmwand en helpt het waterige ontlasting weer normaal te maken. Dimexanol™ heeft daarbij geen effect op de peristaltiek van de darmen (darmwerking wordt niet stilgelegd).
- Vult het tekort aan vocht en zouten aan om uitdroging bij diarree te voorkomen (O.R.S.).

2. Wat is Dimexanol™ voor kinderen

Bruistabletten met Morilyte™, een natuurlijke eetbare klei met een 3-lagen structuur en een bindcapaciteit die hoger is dan die van de meeste kleisoorten. Deze structuur zorgt voor een hoge kationuitwisselingscapaciteit en voor het vermogen om virussen, giftige stoffen en bacteriën vast te houden. Daarnaast bevatten de tabletten ook dextrose, citroenzuur, calciumcarbonaat, natriumchloride, kaliumbicarbonaat, natriumbicarbonaat, sinaasappel-grapefruitaroma, aspartaam en acesulfaam K.

3. Hoe gebruikt u Dimexanol™ voor kinderen

- Bruistabletten met lekkere smaak voor orale inname.
- De bruistablet in een half glas water (circa 125 ml) oplossen en opdrinken.
- Kinderen ouder dan 2 jaar: neem 2-3x daags 1 tablet.
- Kinderen jonger dan 2 jaar: neem 2x daags 1 tablet.
- Bij kinderen jonger dan 5 jaar wordt geadviseerd om vóór gebruik uw arts of apotheker te raadplegen.
- Als u een dosis vergeet, is het niet nodig de volgende dosis te verduubbelen, ga gewoon verder met de behandeling indien nodig.
- Overschrijd de aanbevolen dagelijkse dosering niet. Overdosering kan tot obstipatie (verstopping) leiden. Als u de dagelijkse dosering overschreden hebt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg uw arts als de symptomen na twee dagen nog aanhouden.

Deze behandeling neemt de behoefte aan vocht- en elektrolytentherapie niet weg wanneer die nodig is, vooral bij jonge kinderen.

4. Voor gebruik van Dimexanol™ voor kinderen

Dit product is geschikt voor de meeste kinderen, maar sommige kinderen kunnen het niet gebruiken. Als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Dimexanol™ voor kinderen moet met voorzorg worden gebruikt als uw kind een voorgeschiedenis van ernstige obstipatie heeft.

Gebruik Dimexanol™ voor kinderen niet:

- Bij ernstige en aanhoudende diarree
- Als uw kind allergisch is voor één van de ingrediënten
- Als uw kind een zeer natriumarm dieet volgt
- Als uw kind fenylketonurie of nieraandoeningen heeft

Als uw kind medicijnen gebruikt

Het wordt aanbevolen om ten minste 2 uur vóór het innemen van Dimexanol™ voor kinderen en 2 uur daarna geen andere medicijnen te gebruiken. Meld het aan uw arts of apotheker als uw kind andere medicatie neemt of recent heeft genomen. Dit geldt ook voor medicatie die zonder voorschrift verkrijgbaar is.

5. Mogelijke bijwerkingen

- Zoals alle producten kan Dimexanol™ voor kinderen bijwerkingen hebben, hoewel niet iedereen die ervaart en deze gewoonlijk mild van aard zijn.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij uw kind

een bijwerking optreedt die niet in deze gebruiksaanwijzing is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

- Stop bij een allergische reactie met het nemen van Dimexanol™ voor kinderen en raadpleeg uw arts. De symptomen kunnen o.a. omvatten: uitslag, problemen bij slikken of ademen, zwelling van de lippen, gezicht, keel of tong.
- Als een medische aandoening optreedt na inname van Dimexanol™ voor kinderen, raadpleeg dan uw arts.

6. Hoe bewaart u Dimexanol™ voor kinderen

- Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.
- Houd het buisje goed gesloten en bewaar het op een koele, droge plaats (beneden 25°C).
- De drank meteen na bereiding innemen. Voor zuigelingen die mogelijk meer tijd nodig hebben om de volledige oplossing te drinken: houd de drank in de koelkast bewaard (maximaal 6 uur) en roer goed voor het drinken.
- Niet gebruiken na de vervaldatum: zie verpakking en buisje.
- Dit product mag niet afgevoerd worden via het afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker hoe producten die niet langer nodig zijn, afgevoerd moeten worden. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

Dimexanol™ voor kinderen is een product van Bional Medical. De maag-darmproducten van Bional Medical zijn effectieve producten van natuurlijke oorsprong die wetenschappelijk zijn bewezen. Is uw maag- darmstelsel om welke reden dan ook uit balans? Dan biedt Bional Medical eenvoudige oplossingen die u helpen het evenwicht te herstellen en uw maag- darmstelsel gezond te houden.

- Bional Medical **Regulamine™ sachets**: voor een regelmatige stoelgang en goede darmbalans.
- Bional Medical **Reduflux™ tabletten en vloeibare sachets**: bij brandend maagzuur en zure oprispingen. Werkt snel en tot wel 4 uur lang.
- Bional Medical **Redugas™**: snelle maar zachte verlichting bij een opgeblazen gevoel en winderigheid door herstel van de darmflora.
- Bional Medical **Dimexanol™ en Dimexanol™ voor kinderen**: effectieve, natuurlijke 2-in-1-behandeling voor diarree die de symptomen behandelt en het vochttekort in het lichaam aanvult.

Dit zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Kijk voor meer informatie op www.bional.nl

Fabrikant:

InQpharm Europe Ltd., Waldeeweg 6, 13467 Berlijn, Duitsland

Distributeur:

Omega Pharma Nederland B.V., Postbus 6612,
3002 AP Rotterdam, Nederland



Dimexanol™ voor kinderen is een gecertificeerd medisch hulpmiddel waarvan de veiligheid en doeltreffendheid beoordeeld zijn onder de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG.

Datum aangepast

Oktober 2012



MEDICAL

2158A



0197